

### GRILLE DE CORRECTION – NOTIONS ET MOTS CLES

|   |  |
|---|--|
| <b><u>MOT CLE</u> : La Rage</b>   | <b>2</b>                               |
| <b><u>MOT CLE</u> : Souche Virale</b>   | <b>1,5</b>                             |
| <b><u>NOTION</u> :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'enfant a été contaminé à l'étranger (Sri-Lanka)</li> <li>• Il a été mordu par un chiot errant</li> <li>• L'enfant n'a aucun traitement prophylactique après exposition</li> </ul> | <b>0,5</b><br><b>0,5</b><br><b>0,5</b> |
| <b><u>NOTION</u> :</b> Transmission par la salive par : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Léchage d'une plaie</li> <li>• Les morsures</li> </ul>   | <b>0,75</b><br><b>0,75</b>             |
| <b><u>MOT CLE</u> : Encéphalite (rabique)</b>   | <b>1,5</b>                             |
| <b><u>MOT CLE</u> : Signes cliniques</b>  | <b>1,5</b>                             |
| <b><u>NOTION</u> :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toujours mortelle une fois les signes cliniques neurologiques apparus (confusion, difficultés à avaler)</li> <li>• Incubation de quelques jours à plusieurs mois</li> </ul>         | <b>0,75</b><br><b>0,75</b>             |
| <b><u>NOTION</u> :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stock suffisant de vaccins (250 dose) pour une première vague de vaccination</li> <li>• Transmission interhumaine presque nul</li> </ul>  | <b>0,5</b><br><b>0,5</b>               |
| <b><u>NOTION</u> :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste des personnes en contact direct avec l'enfant (dans les 15 jours précédant les symptômes)</li> <li>• Evaluer le risque d'exposition et la possible vaccination</li> </ul>     | <b>0,75</b><br><b>0,5</b>              |
| <b><u>MOT CLE</u> : (Campagne de) Prévention</b>  | <b>1</b>                               |
| <b><u>MOT CLE</u> : Traitement prophylactique</b>   | <b>0,5</b>                             |
| <b><u>MOT CLE</u> : Vaccin</b>  | <b>1</b>                               |
| <b><u>NOTION</u> :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage à l'eau et au savon</li> <li>• Traitement consiste à 4-5 injections intramusculaires du vaccins antirabiques</li> </ul>   | <b>0,25</b><br><b>0,5</b>              |
| <b><u>NOTION</u> :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contamination à l'étranger (pas de cas autochtones)</li> <li>• Importation de l'étranger</li> <li>• Précautions lors de voyages dans les zones signalées à risque</li> </ul>        | <b>0,5</b><br><b>0,5</b><br><b>0,5</b> |
| <b><u>ORTHOGRAPHE</u> :</b>   | <b>2</b>                               |
| <b>SYNTAXE :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Grand contre-sens = -1</li> <li>✓ Petit contre-sens = -0,5</li> <li>✓ Comptage des mots = entre -0,25 et -0,75 à vous de juger s'il y a abus</li> </ul>                                   |  |
| <b><u>Total</u></b>   | <b>20</b>                              |
| <b>X5</b>   | <b>100</b>                             |

### **Correction : Un cas de rage importé en France chez un enfant**

#### **Texte résumé en 66 mots.**

Un enfant / a contracté / une souche / virale / de la rage / transmise / par : / la salive / lors / d'une morsure. / Les encéphalites / rabiques / sont / toujours / mortelles / une fois / les signes / cliniques / neurologiques / apparus. / Le stock / de 250 / vaccins / suffiraient, / la transmission / interhumaine / étant / infime. / La prévention / des personnes / en / contact / direct / du malade / (15 jours / avant / les symptômes) / est / nécessaire / afin / d'évaluer : / 1) le risque / d'exposition / 2) l'éventuelle / vaccination. / Le traitement / prophylactique / consiste / en / 4-5 injections / intra-musculaire / de vaccin / anti-rabique. / En France, / tous / les cas / sont / importés / de l'étranger / nécessitant / des précautions / lors / de voyage / dans / des zones / risquées.