

UE 9 - DM n°1 :

Sujet du CCB de la TTR / Tout le programme



SUJET TYPE CONCOURS – 15 QCMS – 20 MIN

QCM 1 : Sur le bord antérieur de l'os coxal on trouve :

- A) L'épine iliaque antéro-inférieure qui est palpable
- B) Le bord supérieur de la branche inférieure du pubis
- C) L'épine du pubis sur laquelle s'insère le muscle droit antérieur de l'abdomen
- D) La tubérosité du moyen fessier, partie la plus épaisse de l'os coxal
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

QCM 2 : A propos de l'os coxal :

- A) La surface articulaire coxal du sacrum est encroutée de cartilage et à la forme d'un angle droit
- B) Il a la forme d'une hélice de bateau avec une pale supérieure qui regarde en bas et en arrière et une pale inférieure qui regarde en bas et en avant
- C) Sur une vue latérale on peut voir l'acétabulum qui est une demi sphère contenant une surface articulaire encroutée de cartilage
- D) La ligne arquée sépare le grand bassin du petit bassin et s'étend de la symphyse pubienne au promontoire
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

QCM 3 : A propos du sacrum :

- A) La crête sacrée médiale est le vestige de la fusion des processus épineux
- B) Les crêtes sacrées latérales sont les vestiges de la fusion des processus articulaires
- C) Les foramens sacrés antérieurs se trouvent entre les crêtes sacrées médiales et latérales
- D) Le canal triangulaire est obturé d'une membrane à sa partie inférieure en regard de la vertèbre S4
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

QCM 4 :

On peut dire que l'articulation sacro-iliaque est une articulation cartilagineuse ayant la forme d'un bouton pression

Car la surface mâle coxale et la surface femelle sacrée se complète

- A) VV liées
- B) VV non liées
- C) VF
- D) FV
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

QCM 5 : A propos du réseau lymphatique du petit bassin de la femme :

- A) Celui-ci est très riche c'est pour cela que le cancer y est très fréquent
- B) La vulve et la marge anale se drainent préférentiellement dans les cadrans internes des nœuds lymphatiques inguinaux superficiels
- C) Les chaînes lymphatiques iliaques internes (chaînes médiale, moyenne et latérale) prennent leurs noms selon leur position vis-à-vis de l'artère et de la veine iliaque interne
- D) La chaîne lymphatique iliaque primitive aussi appelée chaîne lymphatique commune résulte de la réunion des chaînes lymphatiques iliaques internes et externes
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

QCM 6 :

Alicia âgée de 64 ans et mère de 3 enfants fait une visite chez sa gynécologue. Lors de l'examen gynécologique on peut voir des caroncules hyménales au niveau de l'introït du vagin

Car le muscle constricteur de la vulve a de grande chance d'avoir disparu

- A) VV liées
- B) VV non liées
- C) VF
- D) FV
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

QCM 7 : A propos de l'innervation du périnée :

- A) Le périnée cutané est innervé dans sa partie moyenne et interne par le nerf pudendal qui résulte de l'anastomose des rameaux antérieurs de S2, S3 et S4
- B) Pour la partie postérieure du périnée cutané, c'est en outre le nerf rectal inférieur qui l'innerve
- C) Le nerf pudendal fournit donc une innervation à la fois sensible pour le périnée cutané et une innervation motrice pour le périnée musculaire
- D) Le nerf honteux qu'en a lui n'innerve aucun territoire du périnée
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

QCM 8 :

Le levator ani peut entraîner des descentes d'organes si celui-ci est affaibli comme par exemple des hystérocèles (l'utérus glisse et apparaît à travers la vulve)

Parce que c'est sur lui que repose toute la cavité abdominale

- A) VV liées
- B) VV non liés
- C) VF
- D) FV
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

QCM 9 : A propos du vagin, donnez la (les) vraie(s) :

- A) Il est convexe en arrière et est rosé
- B) Le vagin est majoritairement recouvert de péritoine : il est péritonisé
- C) La colonne longitudinale postérieure bifurque et forme ainsi le trigone vaginal de Pawlick
- D) Les $\frac{3}{4}$ supérieurs du vagin sont exclusivement somatiques, innervés par le nerf honteux S2-S3-S4
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

QCM 10 : A propos de l'utérus, donnez la (les) vraie(s) :

- A) L'angle d'antéflexion est de 90° entre le vagin et l'utérus
- B) Le ligament rond et le ligament utéro-ovarien sont des éléments de stabilité de l'utérus
- C) La tunique interne, aussi nommée l'endomètre, présente 3 couches : une couche longitudinale superficielle, une circulaire moyenne et une plexiforme interne
- D) Une péridurale nous permettra d'obtenir une analgésie périnéale avec persistance des contractions de l'utérus et de la sensibilité végétative des contractions
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

QCM 11 : A propos de l'ovaire, donnez la (les) vraie(s) :

- A) La corticale assure une fonction exocrine : la ponte ovulaire
- B) L'ovaire est intra-péritonéal et péritonisé
- C) Par contre, le hile de l'ovaire est la seule région de l'ovaire non péritonisée
- D) Le drainage veineux de l'ovaire est asymétrique : à gauche la veine ovarique se jette dans la veine rénale gauche tandis qu'à droite la veine ovarique se jette directement dans la veine cave inférieure
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

QCM 12 : A propos de la trompe, donnez la (les) vraie(s) :

- A) L'oviducte est composée de 4 portions : le pavillon, l'ampoule, l'isthme et l'infundibulum
- B) Si l'implantation de l'œuf se fait dans la trompe (grossesse extra-utérine) elle risque de se rompre et de causer une hémorragie gravissime
- C) Chez la nullipare, les trompes sont disposées de manière oblique
- D) Chez la multipare, les trompes sont en position rétro-urétrale (en arrière de l'urètre)
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

QCM 13 : A propos du rectum, donnez la (les) vraie(s) :

- A) L'ampoule est péritonisée tandis que le canal anal est non péritonisé, ces derniers sont séparés par le cap anal
- B) Le toucher rectal permet l'exploration du cul-de-sac vésico-vaginal de Douglas
- C) Le rectum présente 3 plis transverses : 2 à droite et 1 à gauche
- D) Le sphincter interne strié est composé de 3 faisceaux : profond, superficiel et sous-cutané
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

QCM 14 : A propos de la lame-sacro-recto-génito-pubienne, donnez la (les) vraie(s) :

- A) Elle repose sur des vaisseaux et des éléments nerveux : le plexus hypogastrique supérieur
- B) L'aileron antérieur est composé du ligament pubo-vésical et du ligament utéro-vésical
- C) C'est un des éléments de la stabilité des organes pelviens
- D) L'aileron latéral, aussi appelé ligament rond, correspond à la base du ligament large
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

QCM 15 : A propos du ligament large, donnez la (les) vraie(s) :

- A) Il représente un élément de stabilité pour les organes du petit bassin
- B) La ligne de réflexion utérine est trifoliée : elle présente 3 ailerons (trompe, ligament utéro-ovarien, ligament rond)
- C) La ligne de réflexion pariétale est quant à elle bifoliée car la trompe ne va pas jusqu'à la paroi et le ligament lombo-ovarien prend le relais sur le ligament utéro-ovarien
- D) La partie latérale de l'utérus est non péritonisée, elle est composée de haut en bas de : la région des ailerons, le mésomètre, le paramètre
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses