

1/	ABCD	2/	BCD	3/	ABCD	4/	ABCD	5/	ABD
6/	BCD	7/	BCD	8/	AB	9/	E	10/	E
11/	C	12/	D	13/	E	14/	C	15/	C

QCM 1 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : BCD

- A) Faux : l'EIAI est sur le **bord antérieur** de l'os coxal !
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : n'oubliez pas que cet angle est **ouvert en arrière**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le tronc lombo-sacral (L4-L5) **participe** à la formation du nerf sciatique (**L4-L5-S1-S2-S3**)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : BCD

- A) Faux : c'est une glande intra-péritonéale **NON péritonisée**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : BCD

- A) Faux : la LSRGP n'est **pas intra-péritonéale** (sous péritonéale à la rigueur)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : l'utérus présente un angle **d'antéversion et d'antéflexion**
- D) Faux : le fornix, ou cul de sac du vagin, est la partie la plus profonde du vagin
- E) Faux

QCM 9 : E

- A) Faux : le sphincter interne de l'anus est à motricité **involontaire** (c'est un sphincter lisse)
- B) Faux : alors non, le sphincter strié externe est un muscle à part entière du diaphragme périnéal
- C) Faux : c'est le muscle corrugator cutis ani qui est responsable des plis radiés
- D) Faux : il y en a !
- E) Vrai

QCM 10 : E

Première proposition : une bartholinite entraîne une sécheresse et non pas un écoulement

Deuxième proposition : les glandes vestibulaires majeures s'abouchent dans le **vestibule du vagin**, à sa partie postérieure

QCM 11 : C

Les nœuds inguinaux sont autour de la crosse de la **grande** veine saphène, et pas de la petite

QCM 12 : D

La vessie pleine et distendue bombe au-dessus de la symphyse pubienne ; le but du cathétérisme sus-pubien est justement de drainer la vessie qui ne peut pas se vider naturellement, **sans traverser la cavité péritonéale**

QCM 13 : E

Première proposition : le drainage lymphatique de l'ovaire droit se faire vers la **veine cave inférieure**

Deuxième proposition : les conduits lymphatiques qui suivent la veine gonadique droite se jettent **dans la VCI**

QCM 14 : C

Le cul de sac de Douglas est sur la **face antérieure du rectum** (entre utérus/vagin et rectum)

QCM 15 : C

Les paquets hémorroïdaires sont le plus souvent à **3h, 7/8h et 11h** ! Souvenez-vous, 3+8 = 11