


ANNATUT'

ANATOMIE DU PETIT BASSIN DE LA FEMME

UE9

[Année 2012-2013]



- ⇒ Qcm issus des Tutorats, classés par chapitre
- ⇒ Correction détaillée



PAES - QCM

SOMMAIRE

1. Structure osseuse du petit bassin de la femme	3
Correction : Structure osseuse du petit bassin de la femme	5
2. Parois musculaires et angulations du petit bassin	6
Correction : Parois musculaires et angulations du petit bassin	7
3. Vascularisation, Innervation et Drainage lymphatique.....	8
Correction : Vascularisation, Innervation et Drainage lymphatique	10
4. L'utérus, ses moyens de fixité et ses annexes	11
Correction : L'utérus, ses moyens de fixité et ses annexes.....	12
5. Appareil urinaire.....	13
Correction : L'appareil urinaire.....	14
6. Le vagin et l'ovaire.....	15
Correction : Le vagin et l'ovaire	16
7. Le rectum.....	17
Correction : Le rectum	18

1. Structure osseuse du petit bassin de la femme

2011 – 2012 (Pr. De Peretti)

QCM 1 : Concernant l'os coxal, donner les propositions vraies :

- A) Il résulte de la fusion de 3 os
- B) Il a la forme d'une hélice de bateau à 2 pales
- C) La pale supérieure est formée du pubis et de l'ischion
- D) La face externe de la pale inférieure regarde en avant et en dehors
- E) toutes les réponses sont inexactes

QCM 2 : Concernant le bord antérieur de l'os coxal, donner les propositions vraies :

- A) De haut en bas on décrit en premier l'épine iliaque postéro-supérieur.
- B) La vallée du psoas fait partie du bord antérieur
- C) La petite échancrure ischiatique fait partie du bord antérieur
- D) L'épine iliaque antéro-supérieur est dans le même plan que la symphyse pubienne
- E) toutes les réponses sont inexactes

QCM 3 : La pyramide iliaque est une zone utilisée par les chirurgiens pour des prélèvements de tissus spongieux CAR C'est une zone où l'os coxal est très épais avec beaucoup de tissu spongieux.

- A) le fait et la raison sont tous deux justes et liés
- B) Le fait et la raison sont tous deux justes et non liés
- C) Le fait est juste et la raison est fausse
- D) Le fait est faux et la raison est juste
- E) Le fait et la raison sont tous deux faux

QCM 4 : Concernant le sacrum, donner les propositions vraies

- A) Par les trous sacrés pelviens passent les rameaux antérieurs des nerfs spinaux pelviens
- B) La crête sacrée interne est le vestige des processus épineux
- C) Le promontoire est défini comme le bord antérieur de S2
- D) La pente sacrée est le plan de lancement des courbures du rachis
- E) toutes les réponses sont inexactes

QCM 5 : Concernant la ceinture pelvienne, donner les propositions vraies

- A) Elle est formée en arrière et au milieu par le sacrum
- B) Elle est formée latéralement par les 2 os coxaux
- C) L'articulation entre l'os coxal et le sacrum se nomme l'articulation sacro-iliaque
- D) Le fémur fait partie de l'articulation sacro-iliaque
- E) toutes les réponses sont inexactes

QCM 6 : Concernant l'étude synthétique de la ceinture pelvienne, donner les propositions vraies :

- A) Le détroit supérieur est formé par la ligne arquée et le bord antérieur de S1
- B) La vessie se projette en regard du trou obturé
- C) Le col de l'utérus se projette au niveau de l'épine ischiatique
- D) Le rectum épouse la concavité sacrée
- E) toutes les propositions sont inexactes

QCM 7 : Concernant l'articulation du pubis, donner les vraies :

- A) C'est une articulation de type symphyse
- B) Il existe un fibrocartilage d'interposition entre les deux surfaces articulaires
- C) Elle est renforcée par un ligament inférieur sur lequel s'insère le clitoris
- D) L'écart normal entre les deux os est de l'ordre de 10cm
- E) toutes les propositions sont inexactes

QCM 8 : Concernant l'articulation sacro-iliaque, donner les propositions vraies :

- A) C'est une articulation synoviale de type symphyse
- B) Le ligament inter-osseux est très puissant
- C) La partie femelle de l'articulation se trouve sur le sacrum
- D) Le sommet de la crête iliaque se projette en regard du disque inter-vertébral L4-L5
- E) toutes les réponses sont inexactes

QCM 9 : Concernant le détroit supérieur, donner les propositions vraies :

- A) Il a la forme de l'entrecroisement de 2 ellipses
- B) Cet entrecroisement permet la présentation de la tête de l'enfant
- C) Le bord antérieur de l'os coxal chez la femme est en forme de voute gothique
- D) La voute gothique est plus résistante à l'écrasement que la voute romane
- E) toutes les propositions sont inexactes

QCM 10 : Concernant le détroit inférieur, donner les propositions vraies :

- A) Il est limité en arrière par le bord inférieur de la symphyse pubienne
- B) Le bord inférieur du coccyx et l'écartement des deux ischions délimitent aussi le détroit inférieur
- C) Les diamètres du détroit inférieur sont plus grands que les diamètres du détroit supérieur
- D) Lors de l'accouchement on peut assister à des phénomènes de nutation
- E) toutes les réponses sont inexactes

Correction : Structure osseuse du petit bassin de la femme**2011 – 2012****QCM 1 : Réponse A, B, D**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la pale supérieure est formée par l'aile iliaque.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : Réponse B, D

- A) Faux : c'est l'épine iliaque antéro-supérieur (et oui on parle du bord antérieur !)
- B) Vrai
- C) Faux : la petite échancrure ischiatique est sur le bord postérieur de l'os coxal
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : Réponse A**QCM 4 : Réponse A, D**

- A) Vrai
- B) Faux : crête sacrée interne est le vestige des processus articulaires et crête sacrée médiane est le vestige des processus épineux
- C) Faux : promontoire est le bord antérieur de S1
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : Réponse A, B, C

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le fémur n'intervient en rien dans l'articulation sacro-iliaque
- E) Faux

QCM 6 : Réponse A, B, C, D

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : Réponse A, B, C

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : l'écart normal entre les deux os est de l'ordre de 1cm ! (vous vous imaginez un écart de 10cm.. ;))
- E) Faux

QCM 8 : Réponse B, C, D

- A) Faux : c'est une articulation synoviale de type arthroïde
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : Réponse A, B, D

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : chez la femme c'est en forme de voûte romane (bien plus arrondi)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : Réponse B, D

- A) Faux : limite en avant
- B) Vrai
- C) Faux : les diamètres sont plus petits
- D) Vrai
- E) Faux

2. Parois musculaires et angulations du petit bassin

2011 – 2012 (Pr. De Peretti)

QCM 1 : Concernant le périnée, donnez les propositions vraies :

- A) Le périnée est l'ensemble des parties molles qui ferment en avant le petit bassin
- B) Le méat urinaire se situe en arrière du vestibule vaginal
- C) Les glandes urétrales, servant à la lubrification de la vulve, sécrètent la cyprine
- D) En anatomie modale, l'hymen reste totalement imperforé jusqu'au premier rapport sexuel
- E) L'ensemble de ces propositions sont inexactes

QCM 2 : Concernant le périnée musculaire, donnez les propositions vraies :

- A) Le muscle sphincter strié de l'anus est le seul muscle du périnée musculaire présent dans le triangle postérieur périnéal
- B) Les bulbes vestibulaires du clitoris sont entourés par les muscles bulbo-spongieux
- C) Muscles bulbo-spongieux et ischio-caverneux se réunissent en avant par un tendon commun
- D) Chez la femme, l'érection des corps érectiles est considérée comme imparfaite
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 3 : Concernant les muscles mobilisateurs de la hanche, donner les propositions vraies :

- A) On décrit le muscle obturateur interne et le muscle piriformis
- B) Le tendon du muscle obturateur interne passe par la grande échancrure ischiatique
- C) Dans le canal sus piriformis passe le pédicule vasculo-nerveux glutéal supérieur
- D) En règle générale, le nerf sciatique passe dans le canal sous pyramidal
- E) toutes les propositions sont inexactes

QCM 4 : Concernant le diaphragme pelvien, donner les propositions vraies :

- A) Il est constitué de 2 muscles : muscle Levator ani et muscle Coccygien
- B) Le muscle coccygien double en profondeur le ligament sacro épineux
- C) Les muscles Levator ani et Coccygien sont innervés par le plexus sacré
- D) Le diaphragme pelvien est l'unique diaphragme de l'organisme
- E) Toutes les propositions sont inexactes

QCM 5 : Concernant le système d'angulation et de plicature de la région pelvienne, donner les propositions vraies

- A) Entre le vagin et l'horizontal en position debout, il existe un angle de 60-65° ouvert en avant
- B) Le vagin présente un angle vaginal, ouvert de 135° en arrière
- C) Il existe un angle cervico-vaginal, entre le col et le vagin, ouvert de 90 à 110°
- D) Il existe une angulation utérine, d'environ 100 à 120°
- E) Toutes ces réponses sont inexactes

Correction : Parois musculaires et angulations du petit bassin**2011 – 2012****QCM 1 : Réponse E**

- A) Faux : Le périnée ferme le petit bassin en bas
- B) Faux : Le méat urinaire se situe en avant du vestibule vaginal
- C) Faux : Ce sont les glandes vestibulaires majeures de Bartholin qui permettent la sécrétion de la cyprine
- D) Faux : Il présente une perforation permettant d'évacuer les menstruations
- E) Vrai

QCM 2 : Réponse A, B, C, D

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : Réponse A, C, D

- A) Vrai
- B) Faux : petite échancrure ischiatique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : Réponse A, B, C

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Il y a d'autre diaphragmes : le thoraco-abdominal, le diaphragme de l'iris etc...
- E) Faux

QCM 5 : Réponse B, C, D

- A) Faux : C'est ouvert en arrière
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

3. Vascularisation, Innervation et Drainage lymphatique

2011 – 2012 (Pr. De Peretti)

QCM 1 : Concernant les parois vasculaires du petit bassin, donnez les propositions vraies :

- A) L'aorte et sa division en artères iliaques primitives sont latéralisés sur la droite du rachis
- B) Les artères iliaques primitives se divisent en regard de l'articulation sacro-iliaque
- C) A gauche, l'uretère passe en général par-dessus l'artère iliaque commune
- D) L'artère hypogastrique se divise rapidement en 2 troncs : antérieur et postérieur
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 2 : Concernant les parois nerveuses du petit bassin, donnez les propositions vraies :

- A) Le plexus lombo-sacré est composé des rameaux antérieurs des nerfs spinaux provenant des myélomères de L4 à S3, et de leur anastomoses
- B) Le plexus hypogastrique supérieur reçoit des afférences de la part du plexus hypogastrique inférieur et des nerfs érecteurs d'Eckardt
- C) Le nerf sciatique (ou ischiatique) est uniquement formé des nerfs spinaux en provenance du tronc lombo-sacré
- D) Le nerf obturateur provient des myélomères S2, S3 et S4
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 3 : Concernant la vascularisation des viscères pelviens, donnez les propositions vraies :

- A) L'artère utérine a un trajet godronné sur le bord latéral de l'utérus
- B) L'artère utérine se divise en 4 artères terminales en regard de la corne de l'utérus
- C) L'ovaire n'est vascularisée que par l'artère ovarique
- D) La vascularisation des organes pelviens génitaux et urinaires n'est jamais compromise
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 4 : Concernant le drainage lymphatique des viscères pelviens, donnez les propositions vraies :

- A) A droite, l'ovaire se draine, entre autres, dans les noeuds lymphatiques rénaux
- B) Le principal drainage lymphatique de l'utérus se fait vers les chaînes iliaques internes et externes
- C) La partie basse du vagin se draine vers les noeuds lymphatiques inguinaux superficiels
- D) La vessie se draine surtout vers les noeuds iliaques internes
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 5 : Concernant la vascularisation du rectum, donnez les propositions vraies ;

- A) L'artère rectale supérieure a pour origine l'artère mésentérique supérieure
- B) L'artère rectale inférieure a pour origine l'artère mésentérique inférieure
- C) L'artère rectale moyenne est une branche de l'artère iliaque interne
- D) La partie distale du rectum est entre autre irriguée par l'artère sacrée médiane
- E) Toutes ces réponses sont inexactes

QCM 6 : L'artère rectale moyenne est inconstante CAR elle est une branche de l'artère iliaque externe

- A) le fait et la raison sont tous deux justes et liés
- B) Le fait et la raison sont tous deux justes et non liés
- C) Le fait est juste et la raison est fausse
- D) Le fait est faux et la raison est juste
- E) Le fait et la raison sont tous deux faux

QCM 7 : Le sang veineux du rectum va essentiellement se drainer dans la veine mésentérique supérieure CAR La veine rectale inférieure se draine vers le système cave

- A) le fait et la raison sont tous deux justes et liés
- B) Le fait et la raison sont tous deux justes et non liés
- C) Le fait est juste et la raison est fausse
- D) Le fait est faux et la raison est juste
- E) Le fait et la raison sont tous deux faux

QCM 8 : Une infection des organes génitaux externes telle que la syphilis peut se témoigner par une adénopathie du pli de l'aîne CAR Les organes génitaux externes possèdent un drainage lymphatique qui va se faire vers les ganglions inguinaux superficiels

- A) le fait et la raison sont tous deux justes et liés
- B) Le fait et la raison sont tous deux justes et non liés
- C) Le fait est juste et la raison est fausse
- D) Le fait est faux et la raison est juste
- E) Le fait et la raison sont tous deux faux

Correction : Vascularisation, Innervation et Drainage lymphatique**2011 – 2012****QCM 1 : Réponses B, C, D**

- A) Faux: Ils sont latéralisés sur la gauche du rachis
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : Réponses A

- A) Vrai
- B) Faux: C'est le plexus hypogastrique inférieur qui reçoit des afférences du plexus hypogastrique supérieur
- C) Faux: Le tronc lombo-sacré c'est l'union des racines antérieures de L4 et L5, or le nerf sciatique reçoit aussi les rameaux antérieurs de S1, S2 et S3.
- D) Faux: Il provient des myélomères L2 L3 et L4
- E) Faux

QCM 3 : Réponses A, B, D

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux: L'ovaire est vascularisé par l'artère ovarique, par le rameau ovarique de l'artère utérine et par l'artère tubaire en provenance de l'artère utérine ! C'est très important !
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : Réponses B, C, D

- A) Faux: C'est à gauche que l'ovaire peut se drainer dans les noeuds lymphatiques rénaux.
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : Réponses C, D

- A) Faux: c'est l'artère mésentérique inférieure
- B) Faux: c'est l'artère iliaque interne
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : Réponses C

Elle provient de l'artère iliaque interne

QCM 7 : Réponses D

Vers la veine mésentérique inférieure

QCM 8 : Réponses A

4. L'utérus, ses moyens de fixité et ses annexes

2011 – 2012 (Pr. De Peretti)

QCM 1 : Concernant l'utérus, donnez les propositions vraies :

- A) Trompe, ligament rond et ligament utéro-ovarien s'insèrent sur le fond de l'utérus
- B) L'utérus est antéfléchi et antéversé
- C) Dans les cancers du col utérin, les cellules cancéreuses ne fixeront pas la coloration au lugol
- D) Le péritoine, constituant la tunique externe de l'utérus, recouvre totalement la surface de celui-ci
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 2 : L'utérus est antéfléchi CAR L'angle utéro-vaginal est ouvert de 90° en avant

- A) le fait et la raison sont tous deux justes et liés
- B) Le fait et la raison sont tous deux justes et non liés
- C) Le fait est juste et la raison est fausse
- D) Le fait est faux et la raison est juste
- E) Le fait et la raison sont tous deux faux

QCM 3 : Concernant le ligament large, donnez les propositions vraies :

- A) Le péritoine tapisse les faces latérales de la vessie
- B) Le péritoine tapisse les faces antérieure et postérieure, ainsi que le fond de l'utérus
- C) Le cul de sac de Douglas se développe à partir du septum recto-vaginal
- D) L'aileron supérieur du ligament large, ou mésovarium, est sous-tendu par le ligament utéro-ovarien
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 4 : Concernant le paramètre, donnez les propositions vraies :

- A) Il se trouve en regard de la partie non péritonisée de l'utérus
- B) Y chemine le plexus hypogastrique inférieur
- C) L'uretère y surcroise l'artère utérine
- D) De part et d'autre de la base du ligament large, la lame sacro-recto-génito-pubienne forme le tissu cellulo-fibreux du paramètre
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 5 : Concernant les moyens de fixité de l'utérus, donnez les propositions vraies :

- A) Le col utérin dispose d'une mobilité importante
- B) Le ligament large rattache l'utérus aux parois latérales du corps
- C) Le ligament large est une formation péritonéale très tendue, assurant une grande stabilité à l'utérus
- D) La lame sacro-recto-génito-pubienne, le vagin et le noyau fibreux central du périnée sont les éléments de fixité majeurs de l'utérus
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 6 : Concernant les annexes de l'utérus, donnez les propositions vraies :

- A) On décrit successivement aux trompes les parties intra-utérine, de l'ampoule, de l'isthme et du pavillon
- B) La frange ovarique couvre l'ovaire et capte l'oeuf pondue
- C) L'ovaire a la forme d'une amande blanche
- D) Le mésovarium présente une ligne d'interruption à la surface de l'ovaire formant le hile ovarien
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

Correction : L'utérus, ses moyens de fixité et ses annexes**2011 – 2012****QCM 1 : Réponses B, C**

A) Faux : Ces 3 éléments s'insèrent au niveau de la corne de l'utérus, et non ce n'est pas pcq la corne est près du fond, ou à l'angle du fond, que l'on peut affirmer cet item

B) Vrai

C) Vrai

D) Faux : Non seulement le péritoine ne recouvre pas la totalité de la surface utérine, mais en plus il ne forme pas la totalité de la tunique externe de celui-ci

E) Faux

QCM 2 : Réponses B

Les 2 propositions sont bien juste, mais la raison décrit pourquoi l'utérus est antéVERSé et non pas antéfléchi. Faites bien la différence entre les 2

QCM 3 : Réponses B, C

A) Faux : Le péritoine ne tapisse que la face supérieure de la vessie.

B) Vrai

C) Vrai

D) Faux : L'aileron supérieur est sous-tendu par la trompe, il est donc également appelé mésoSALPYNX ! Cette partie est à bien connaître

E) Faux

QCM 4 : Réponses A, B, D

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : C'est l'artère utérine qui surcroise l'uretère, et non pas l'inverse

D) Vrai

E) Faux

QCM 5 : Réponses B, D

A) Faux : Au contraire, le col utérin est très fixe, contrairement au corps de l'utérus

B) Vrai

C) Faux : Le ligament large est une formation péritonéale LACHE, qui n'a de valeur mécanique qu'au niveau du paramètre

D) Vrai

E) Faux

QCM 6 : Réponses B, C, D

A) Faux : Successivement il y a la partie intra-utérine, l'isthme, l'ampoule et enfin le pavillon

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

5. Appareil urinaire

2011 – 2012 (Pr. De Peretti)

QCM 1 : Concernant l'appareil urinaire, donnez les propositions vraies :

- A) Lorsque la vessie est pleine, son pôle supérieur devient facilement accessible par une voie sus-pubienne
- B) Sur une vue frontale le trigone vésicale est à base inférieure
- C) Il existe au niveau de l'urètre une valve d'urothélium empêchant le reflux de l'urine vers la vessie
- D) L'innervation orthosympathique de la vessie permet la contraction du sphincter strié
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

Correction : L'appareil urinaire

2010 – 2011

QCM 1 : Réponse AA) VraiB) Faux: Le trigone vésical est délimité par l'orifice des uretères et de l'urètre. L'urètre est unique, et plus basse que les uretères. Le trigone vésical est donc à base supérieureC) Faux: C'est au niveau des uretères qu'il existe une valve anti-reflux composé d'urothéliumD) Faux : Un sphincter strié est à contraction volontaire, il n'est donc pas contrôlé par un système végétatif... Le système orthosympathique vésical active la contraction du sphincter lisse de la vessieE) Faux

6. Le vagin et l'ovaire

2011 – 2012 (Pr. De Peretti)

QCM 1 : Concernant le vagin, donnez les propositions vraies :

- A) Le cul de sac vaginal postérieur forme le lac spermatique
- B) En règle générale, la cavité vaginale est une cavité réelle
- C) Le trigone vésical se projette au niveau de la paroi antérieure du vagin
- D) Latéralement, le vagin se projette en regard de l'ischion
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte.

QCM 2 : Concernant les éléments de fixité de l'ovaire, donnez les propositions vraies :

- A) Le ligament utéro-ovarien est tendu du corps de l'utérus jusqu'à l'ovaire
- B) La veine ovarique droite se jette dans la veine rénale droite
- C) Le ligament tubo-ovarien relie l'ensemble de la trompe à l'ovaire
- D) Le ligament lombo-ovarien relie l'ovaire aux vertèbres L4 et L5
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

Correction : Le vagin et l'ovaire

2011 – 2012

QCM 1 : Réponses A, C, D

A) Vrai

B) Faux: C'est une cavité virtuelle, en dehors de l'introduction d'un corps intra-vaginal X ou Y (je vous laisse le soin d'imaginer le(s)quel(s)).

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 2 : Réponses E

A) Faux : Il est tendu de la CORNE à l'ovaire

B) Faux: La veine ovarique droite se draine dans la veine cave inférieure, c'est la veine ovarique gauche qui se draine dans la veine rénale.

C) Faux: Il ne relie que la frange ovarique (de Richard) à l'ovaire, et non pas l'ensemble de la trompe

D) Faux : Le ligament lombo-ovarien porte un faux nom, puisqu'il relie l'ovaire aux vaisseaux rétro-péritonéaux, et non pas au rachis lombaire directement. Les vaisseaux rétro-péritonéaux sont cependant solidaires du rachis lombaire de par leur rattachement aux vaisseaux pariétaux. Le rattachement de l'ovaire au rachis lombaire n'est donc qu'indirect.

De plus les vaisseaux gonadiques naissent en regard de L1, et non pas L4 et L5

E) Vrai

7. Le rectum

2011 – 2012 (Pr. De Peretti)

QCM 1 : Concernant le rectum, donner les propositions vraies ;

- A) Le rectum est la partie terminale de l'intestin grêle
- B) Le rectum est un réservoir de matières fécales
- C) La pathologie du rectum est dominée par les infections d'origine anale et les cancers
- D) Le rectum se situe à la suite du côlon sigmoïde
- E) Toutes ces réponses sont inexactes

QCM 2 : Concernant la structure du rectum, donner les propositions vraies ;

- A) Il présente une partie supérieure : le rectum périnéal
- B) Il présente une partie inférieure : le rectum pelvien
- C) Le rectum pelvien présente une dilatation appelée ampoule rectale
- D) Entre les 2 parties du rectum il existe une angulation de 110°, ouverte en arrière
- E) Toutes ces réponses sont inexactes

QCM 3 : Le sphincter anal est un sphincter musculaire circulaire CAR il est sous le contrôle de la motricité volontaire

- A) le fait et la raison sont tous deux justes et liés
- B) Le fait et la raison sont tous deux justes et non liés
- C) Le fait est juste et la raison est fausse
- D) Le fait est faux et la raison est juste
- E) Le fait et la raison sont tous deux faux

QCM 4 : La muqueuse rectale est une muqueuse glandulaire digestive CAR Dans le plan frontal le rectum présente une 2ème courbure à concavité gauche

- A) le fait et la raison sont tous deux justes et liés
- B) Le fait et la raison sont tous deux justes et non liés
- C) Le fait est juste et la raison est fausse
- D) Le fait est faux et la raison est juste
- E) Le fait et la raison sont tous deux faux

QCM 5 : Concernant la muqueuse rectale, donner les propositions vraies ;

- A) Les concavités rectales sont dues à la présence des plis rectaux
- B) Le pli rectal inférieur est aussi appelé le pli de Houston
- C) Les colonnes de Morgagni ont une concavité inférieure
- D) Les glandes d'Hermann et Desfosses se situent au fond des colonnes de Morgagni
- E) Toutes ces réponses sont inexactes

QCM 6 : Lors d'une rectoscopie on ne voit pas à plus de 5 cm à l'intérieur du rectum CAR Il existe des plis rectaux qui soulèvent la muqueuse rectale

- A) le fait et la raison sont tous deux justes et liés
- B) Le fait et la raison sont tous deux justes et non liés
- C) Le fait est juste et la raison est fausse
- D) Le fait est faux et la raison est juste
- E) Le fait et la raison sont tous deux faux

QCM 7 : Concernant la musculature rectale, donner les propositions vraies ;

- A) La couche circulaire interne s'épaissit au niveau des colonnes de Morgagni
- B) Les fibres terminales de la couche longitudinale externe fixent le sphincter lisse de l'anus et les plexus hémorroïdaires à la peau
- C) Le muscle curvator cutis ani permet la modulation du bruit du pép
- D) En règle générale, les infections d'origine anales ont pour origine les glandes d'Hermann et Desfosses
- E) Toutes ces réponses sont inexactes

Correction : Le rectum

2011 – 2012

QCM 1 : Réponses B, C, D

- A) Faux : Le rectum est la partie terminale du tube digestif
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : Réponses C, D

- A) Faux : c'est l'inverse
- B) Faux : c'est l'inverse
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : Réponse B**QCM 4 : Réponse C**

Deuxième courbure à concavité droite

QCM 5 : Réponses A, D

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le pli rectal moyen
- C) Faux : concavité supérieure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : Réponses A

C'est bien parce que les plis rectaux soulèvent la muqueuse, formant des bosselures à l'intérieur du rectum, que l'on ne voit pas très loin en rectoscopie

QCM 7 : Réponses A, B, C, D

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai