

**De la question 1 à la question 7**

**Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?**

**QCM 1 : A propos du sacrum, on peut dire que :**

- A) Il y a 8 trous sacrés pelviens
- B) Il présente une double concavité antérieure verticale et horizontale
- C) Sur la base du sacrum, on peut voir la gouttière de la racine S1 en dehors de la face supérieure du corps de S1
- D) La crête sacrée latérale est le vestige des disques inter corporéaux sacrés
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 2 : A propos de l'os coxal, on peut dire que :**

- A) La grande échancrure sciatique est au-dessous de l'épine iliaque postéro-inférieure
- B) L'épine sciatique ou ischiatique est au-dessus de la petite échancrure sciatique
- C) On s'assoit sur la tubérosité ischiatique
- D) La gouttière du muscle psoas est au-dessus de l'éminence ilio-pubienne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 3 : A propos de la ceinture pelvienne, on peut dire que :**

- A) Les articulations sacro-iliaques sont des articulations cartilagineuses
- B) La ligne arquée de l'os coxal fait avec l'horizontale un angle de 30° ouvert en haut et en arrière
- C) La surface auriculaire encroûtée de cartilage de l'os coxal a la forme d'un angle droit ouvert en avant
- D) Le détroit supérieur est formé par la face antérieure de la symphyse pubienne, la ligne arquée et le bord antérieur de la base du sacrum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 4 : A propos des vaisseaux du petit bassin, on peut dire que :**

- A) La division de l'aorte abdominale est en avant du corps de S1
- B) L'artère iliaque interne chemine en dedans des 3 premiers foramens sacrés pelviens
- C) Les uretères droits et gauches croisent les vaisseaux iliaques en dedans de la division de l'artère iliaque commune
- D) Les deux artères sacrées moyennes naissent de l'artère iliaque commune
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 5 : Parmi les branches de l'artère iliaque interne, on peut citer :**

- A) L'artère rectale supérieure
- B) L'artère rectale moyenne
- C) L'artère utérine
- D) L'artère sacrée moyenne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 6 : A propos des nerfs visibles sur les parois du petit bassin, on peut dire que :**

- A) Le nerf sciatique est formé par l'anastomose des rameaux postérieurs des nerfs spinaux de L4 à S3
- B) Les nerfs érecteurs proviennent des racines L4 L5 et S1
- C) Le plexus sacro-coccygien innerve la marge anale
- D) Le nerf rectal inférieur ou nerf anal provient du plexus sacré et plus particulièrement de la racine S4
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 7 : A propos des ligaments larges de l'utérus, on peut dire que :**

- A) L'aileron supérieur est le mésosalpinx
- B) L'aileron postérieur forme le mésovarium
- C) L'aileron antérieur est sous-tendu par le ligament rond
- D) Le paramètre forme la base du ligament large
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**De la question 8 à la question 15**

**Relation de cause à effet**

**Réponse A** : si le fait et la raison proposés sont tous deux exacts et liés par une relation de cause à effet

**Réponse B** : si le fait et la raison proposés sont tous deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet

**Réponse C** : si le fait est exact mais la raison proposée est fausse

**Réponse D** : si le fait est faux mais la raison proposée est exacte

**Réponse E** : si le fait et la raison sont tous les deux faux

**QCM 8 :**

Le médecin légiste qui examine une jeune fille qui a été violée alors qu'elle était vierge s'attend à retrouver au niveau de l'hymen des caroncules myrtiformes

**PARCE QUE**

Lors de la première pénétration sexuelle complète de la femme il y a déchirure du frein des petites lèvres

**QCM 9 :**

La destruction des glandes vestibulaires majeures de Bartholin qui s'abouchent dans le sillon entre petite et grande lèvre, peut entraîner une sécheresse vaginale lors du coït

**PARCE QUE**

Ce sont les seules formations anatomiques lubrifiantes des organes génitaux de la femme

**QCM 10 :**

Le ligament rond de l'utérus est l'élément essentiel de la stabilité et de la fixation de l'utérus

**PARCE QUE**

L'utérus est antéversé et antéfléchi dans le plan sagittal

**QCM 11 :**

En l'absence d'élément pathologique, l'urine qui remplit la vessie ne reflue pas dans l'urètre

**PARCE QUE**

Il existe une valvule muqueuse anti-reflux au niveau de l'implantation de l'urètre dans la région du trigone vésical

**QCM 12 :**

La miction normale nécessite l'intégrité de l'innervation végétative et somatique

**PARCE QUE**

La contraction du muscle détrusor est parasymphatique, la contraction du sphincter lisse de la vessie est orthosymphatique et la contraction du sphincter strié de la vessie est sous la dépendance du nerf pudendal

**QCM 13 :**

On nomme fornix l'entrée du vagin

**PARCE QUE**

Le fornix, qui veut dire en latin arche ou voute, enserme la racine de la verge de l'homme lors du coït

**QCM 14 :**

Pour les cancers de l'ovaire gauche on recherche des métastases lymphatiques sur les nœuds lymphatiques autour de la veine rénale droite

**PARCE QUE**

Le drainage lymphatique de l'ovaire gauche suit la veine gonadique gauche qui se jette dans la veine rénale droite

**QCM 15 :**

L'ovaire est le seul organe non péritonisé dans la cavité péritonéale

**PARCE QUE**

Oviductes et utérus sont péritonisés et sont en situation sous péritonéale