

**De la question 6 à la question 15**

**Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?**

**QCM 1 : Parmi les muscles du périnée, on peut citer :**

- A) Le muscle piriforme
- B) Le muscle obturateur médial
- C) Le muscle obturateur latéral
- D) Le muscle transverse de l'abdomen
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 2 : Sur le bord postérieur de l'os coxal on trouve :**

- A) L'épine ischiatique ou sciatique au-dessus de la grande échancrure sciatique ou ischiatique
- B) L'épine ischiatique au-dessous de la petite échancrure ischiatique
- C) La tubérosité de l'ischion au-dessous de la petite échancrure ischiatique
- D) L'épine iliaque postéro-inférieure au-dessus de la grande échancrure ischiatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 3 : Sur le bord antérieur de l'os coxal on trouve :**

- A) L'épine du pubis ou tubercule pubien
- B) La gouttière de passage du nerf obturateur au-dessous de la branche horizontale ou supérieure du pubis
- C) La gouttière de passage du nerf fémoral au-dessus de l'éminence ilio-pectinée
- D) L'échancrure iliaque antérieure entre l'éminence ilio-pectinée et le tubercule pubien (épine du pubis)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 4 : A propos de l'articulation entre le pubis droit et le pubis gauche on peut dire que :**

- A) C'est une articulation synoviale
- B) C'est une articulation fibreuse
- C) Elle a une capsule articulaire
- D) Les surfaces articulaires sont encroutées de cartilage
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 5 : A propos du muscle élévateur de l'anus (levator ani) on peut dire que :**

- A) Il a la forme d'un cône à sommet inférieur centré sur le vagin
- B) Il présente en arrière une fente qui est la fente ou hiatus uro-anal
- C) Il est innervé par le nerf obturateur
- D) Il présente un faisceau ilio-sacré et un faisceau pubo-sacré
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 6 : Parmi les myélomères qui reçoivent la sensibilité du périnée cutané on peut citer les myélomères suivants :**

- A) L1
- B) L2
- C) S2
- D) S3
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 7 : A propos des organes génitaux externes de la femme on peut dire que :**

- A) Les caroncules hyménéales sont visibles chez la femme vierge n'ayant pas subi de pénétration vaginale
- B) Le frein du clitoris provient des grandes lèvres
- C) Les petites lèvres présentent les caroncules myrtiformes après l'accouchement
- D) Les glandes vestibulaires majeures s'abouchent au niveau de l'orifice urétral
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 8 : A propos des muscles du périnée, on peut dire que :**

- A) Le muscle ischio-caverneux entoure le bulbe vestibulaire
- B) Le muscle constricteur de la vulve est déchiré après la première pénétration sexuelle du vagin
- C) Le muscle transverse superficiel du périnée est tendu entre l'ischion et le genou du clitoris
- D) Le muscle bulbo-spongieux entoure le corps caverneux du clitoris
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 9 : A propos du ligament large de l'utérus on peut dire que :**

- A) L'aileron antérieur est tendu par l'uretère
- B) Le mésosalpinx forme l'aileron supérieur
- C) Le mésoovarium forme l'aileron postérieur
- D) La base du ligament large s'élargit vers le bas
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 10 : A propos de la vessie on peut dire que :**

- A) Son innervation parasympathique provient des myélomères S2, S3, S4
- B) Le détrusor forme le fascia externe de la vessie
- C) Le trigone vésical est tendu par les cornes de l'utérus
- D) Sa face interne est tapissée par le péritoine pariétal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 11 : A propos du vagin, on peut dire que :**

- A) Il est exclusivement vascularisé par des collatérales de l'artère iliaque interne
- B) Il se projette en regard de la tubérosité obturatrice
- C) Il est majoritairement sous le muscle élévateur de l'anus (levator ani)
- D) Le trigone de Pawlick vaginal répond au triangle rectal de Lieutaud
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 12 : A propos de l'utérus on peut dire que :**

- A) L'angle d'antéversion utéro-vaginal est de 90°
- B) L'angle d'antéflexion utéro-vaginal est de 90°
- C) La couche musculaire la plus interne est circulaire
- D) La couche musculaire intermédiaire est plexiforme
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 13 : A propos du drainage lymphatique pelvien, on peut dire que :**

- A) La vascularisation lymphatique du rectum périnéal (canal anal) se fait préférentiellement en direction des lymphonoeuds de la racine du membre inférieur
- B) La vascularisation lymphatique du rectum périnéal (canal anal) se fait préférentiellement en direction des lymphonoeuds situés en dedans de la crosse de la veine grande saphène (saphène interne)
- C) La vascularisation lymphatique du col de l'utérus se fait en direction des lymphonoeuds iliaques internes puis lombo-aortiques
- D) La vascularisation lymphatique de l'introït vaginal se fait préférentiellement en direction des lymphonoeuds situés en dedans de la crosse de la veine grande saphène (saphène interne)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 14 : A propos du rectum on peut dire que :**

- A) La jonction recto-sigmoïdienne se situe pour les anatomistes en regard de la 4<sup>ème</sup> vertèbre sacrée
- B) La couche musculaire lisse longitudinale s'épaissit après la ligne ano-rectale pour former le sphincter interne
- C) La couche musculaire lisse longitudinale s'unit au muscle élévateur de l'anus (levator ani) pour former le muscle currugator cutis ani qui explique la forme des plis radiés de l'anus
- D) La zone columnaire est située entre la ligne ano-rectale et la ligne pectinée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 15 : A propos de l'ovaire on peut dire que :**

- A) Il existe trois ligaments responsables des moyens de fixité de l'ovaire : lombo-ovarien, tubo-ovarien et utéro-ovarien
- B) L'ovaire est le seul organe entièrement péritonisé
- C) La vascularisation artérielle de l'ovaire est assurée par l'artère ovarique, issue de l'aorte abdominale et par les rameaux tubaire et ovarien issus de l'artère utérine, elle-même issue de l'artère iliaque interne
- D) La veine ovarique droite se draine dans la veine rénale droite
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses