



Amélogénèse

I. Caractéristiques générales

- Il s'agit du processus de sécrétion d'émail par les **améloblastes**

- 3 étapes : 1) Synthèse & sécrétion

2) Maturation

3) Minéralisation

Structure (≠ tissu car acellulaire) **la plus minéralisée**, avasculaire et non innervée.

Origine **ectodermique** car les améloblastes proviennent de l'EDI

Organisée en prismes et substance inter-prismatique formés de cristaux d'hydroxyapatite **(Ca)₁₀(PO₄)₆(OH)₂** poly-substitués par du carbonate.

Présent uniquement au stade de la couronne

Produit seulement pendant un laps de temps donné

1° couche -> 14° semaine de vie IU

II. Différents types d'améloblastes

- Améloblaste Pré-sécréteur
 - Améloblastes sécréteurs sans prolongement de Tomes
 - Améloblastes sécréteurs avec prolongement de Tomes
 - Améloblastes de maturation
 - Améloblastes de protection
- > L'Amélogénèse suit un gradient temporo-spatial de différenciation entre la cuspide et le collet de la dent.

A/ Améloblastes pré sécréteur


- Stade d'histo-différenciation
- En face de la dentine
- Sort de son cycle mitotique avec un décalage de 24h à 66h avec les Odontoblastes
- Cellule qui commence à se polariser : elle s'allonge, noyau au pôle proximal (SI), REG, lysosomes... Complexes jonctionnels au pôle distal (MB) et proximal (SI)

B/ Améloblastes sécréteurs sans prolongement de tomes

- Sécrétion de la 1^o couche d'email. Email aprismatique immature 10 um
- La cellule s'allonge, se polarise encore plus, nombre et organisation des organites de synthèse augmentent
- Vésicules de sécrétion migrent du côté distal, proche du manteau dentinaire
- Synthétise la couche amélo-dentinaire
- Apoptose du RE et collapsus du SI et EDE -> Couche papillaire (rapprochement des vaisseaux vers les améloblastes sécréteurs)

C/ AméloB sécréteurs avec prolongement de tomes

- Sécrète de l'émail Prismatique immature
- Formation du prolongement de tomes au pôle distal
- Présente plusieurs compartiments
- **ATTENTION** : - chaque améloblaste sécrète un seul et unique prisme.
- La SIP est sécrétée par plusieurs Améloblastes.
- Rythme de 4um/J



Compartiment infranucléaire :
mitochondries, granules de
glycogène, REG, systèmes de
jonction et microfilaments

Compartiment nucléaire :
noyau

Compartiment supranucléaire :
REG, Golgi central long et
cylindrique, parallèle au grand
axe, lysosomes

Compartiment apical :
le prolongement de Tomes
terminal web, microfilaments
vésicules de sécrétion et
images d'exocytoses

Protéines sécrétées

- Enaméline
- Tuftéline
- Ameloblastine
- Amélgénine
- Protéases
- Les deux pôles de sécrétion du prolongement Distal et proximal sécrètent les mêmes protéines mais avec 60° d'écart.
- Elles initient la formation des cristaux et contrôlent leur forme et croissance.

D/ Améloblastes de transition

- A la fin du stade de sécrétion
- Apoptose de 25% des améloblastes, se raccourcissent, s'élargissent
- Les organites cellulaires sont dégradés par les lysosomes
- Synthétisent une lame basale adhérente à l'émail immature -> facilite les échanges entre la FD et l'émail immature à travers la CP

E/ Améloblastes de maturation

- 25% d'améloblastes supplémentaires s'apoptosent
- Maturation = croissance en largeur et en épaisseur des cristaux
- Cela nécessite une élimination des nanosphères d'amélogénine + apport massif et simultané de calcium et phosphate

Apport Calcium et phosphate

-
- Couplage entre l'aspect du pôle distal et les jonctions entre les améloblastes (retenir PDS) -> équilibre du pH. Permet apport de H^+ car la MMP20 dégradant l'amélogénine nécessite une certaine acidité. Les débris sont dégradés par les améloblastes
 - Le calcium passe entre les cellules à bordure lisse. C'est un transport actif chez les Améloblastes à bordure plissée.
 - Le phosphate est libéré de l'amélotine grâce aux phosphatases
 - Ainsi on a une croissance des cristaux et une maturation de l'émail : 96% minéraux, 3,2% eau, 0,8% matière organique

F/ Améloblastes de protection

- L'Améloblaste devient cubique, perd ses organites, sécrètent une lame basale
- Ces derniers + la CP forme l'épithélium réduit de l'email
- Cet ERE permet de protéger la dent dans le follicule dentaire tant qu'elle n'est pas arrivée dans la cavité buccale.

Conclusions

- Améloblaste : SEULE cellule à sécréter de l'émail mais très sensible à l'environnement.