
ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE



Articulation temporo-mandibulaire

I. Généralités:

A. Généralités

L'articulation temporo-mandibulaire (ATM), aussi appelée articulation mandibulo-alvéolaire (puisque l'occlusion se fait par contact des dents), est l'articulation entre la mandibule et l'os temporal. On retrouve 2 ATM : une à droite et une à gauche ; toutes 2 unies par la mandibule. On considère ces 2 articulations comme solidaires du fait que les mouvements de l'une vont imprimer les mouvements de l'autre.


Il s'agit d'une articulation synoviale de type <u>condylienne</u> (= ellipsoïde) présentant donc une cavité articulaire avec membrane synoviale (cf. locomoteur UE5) et des surfaces articulaires en forme de fragments d'ellipses.

B. Axes de mobilités

Cette articulation présente 2 axes de mobilité (≠ types de mouvements) :

- 1) Un axe transversal qui passe par les 2 ATM => mouvement d'occlusion et d'ouverture
- 2) Un axe <u>vertical</u> qui passe par chacune des ATM => mouvement de <u>latéralisation</u>

C. Situation dans l'espace



Sur une vue latérale du crâne, la localisation de l'ATM peut être décrite ainsi :


- En avant du méat auditif externe (1)
- En arrière du processus zygomatique (2)
- Au-dessus de la mandibule (3)
- Au-dessous de la région temporale (4)



L'ATM étant une articulation très instable, les luxations surviennent régulièrement.

D. La mandibule

La mandibule est un os impair (il n'y en a qu'un donc impair...) de la face. Autrefois appelé le maxillaire inférieur.



Vue de ¾ de la mandibule

Plusieurs éléments la composent : (pas forcément besoin de connaître ces 2 listes par cœur, c'est plus de la visualisation)

- 1) Le corps qui comporte :
 - Le menton
 - Le foramen mentonnier dans lequel passe le nerf mentonnier (cf. innervation)
 - La ligne oblique latérale
 - L'arcade dentaire
- 2) Les 2 branches qui comportent chacune :
 - La tête
 - Le col
 - Le processus coronoïde
 - La tubérosité masséterique, lieu d'insertion du muscle masséter ++
 - L'incisure mandibulaire
 - La lingula = épine de Spix

On retrouve un <u>angle de 110° entre le corps et la branche</u> de la mandibule. Cet angle se projette en regard de la 2ème vertèbre cervicale (<u>C2</u>) ++++.

E. Les surfaces articulaires = surfaces d'union

- Une particularité de cette articulation : son fibrocartilage d'interposition.
 Aussi appelé disque intra-articulaire, il a la forme « d'une casquette à visière antérieur et à concavité inférieure » +++++.
 - La partie centrale (coiffe) couvre la tête mandibulaire
 - La partie antérieur (visière) s'articule avec le TA.

管 Rappel : 管


Il existe 3 formes de fibrocartilage d'interposition :

- Bourrelet cartilagineux : totalement circulaire = anneau
- 2) Croissant de lune : ménisque
- 3) Circulaire parfois perforé au centre : disque



Le disque intra-articulaire (= fibrocartilage d'interposition) de l'ATM est soumis à des pathologies comparables à celles du ménisque au niveau de l'articulation du genou (les 2 sont des ellipsoïdes).

- Les forces de pression de 100kg sur les condyles lors de la mastication => déformation, déchirement du disque au niveau de la jonction coiffe/visière
- Luxation vers l'avant en position d'ouverture maximum
- On retrouve 2 surfaces articulaires propres à l'ATM : une au niveau de la **tête de la mandibule** et l'autre sur **l'os temporal**, cette dernière formée de 2 parties.



Vue latérale des surfaces articulaires de l'ATM

Surface temporale	Fosse mandibulaire du temporal (FM) = cavité glénoïde	 Cernée en dehors par les tubercules zygomatiques antérieur et postérieur Concave vers le bas
	Tubercule articulaire (TA) = condyle temporal	- Convexe vers le bas
Surface mandibulaire	Tête de la mandibule = condyle mandibulaire	Déjetée en arrière et en dedansFragment d'ellipse plein

II. Les mouvements de l'ATM

Distinguez-bien les 3 types de mouvements ! Vous remarquez que l'ouverture et la fermeture font partie du même mouvement...

• Ouverture et Fermeture (=occlusion)

- L'ouverture de la bouche entraine un abaissement de la mandibule et une <u>antépulsion</u> de la tête de la mandibule dû au ligament collatéral latéral représentant une corde inextensible.
- △ Certains muscles de l'ouverture sont <u>rétropulseurs</u> (voir page 9)
- La fermeture de la bouche, quant à elle, entraine la rétropulsion de la tête de la mandibule.
- Certains muscles de la fermeture sont antépulseurs (voir page 8)

Propulsion (=antépulsion) et rétropulsion

- La propulsion entraine une antépulsion bilatérale +++ de la tête de la mandibule
- Pas de précision supplémentaire du prof sur le mouvement de rétropulsion

3 Latéralisation (=diduction)

 Le mouvement de latéralisation entraine une <u>antépulsion unilatérale</u> +++ de la tête de la mandibule et une rotation autour d'un axe vertical


Ex de latéralisation vers la droite (SDR de l'an dernier) : « La diduction vers la droite est une antépulsion de l'ATM gauche autour d'un axe vertical passant par l'ATM droite »

III. Moyens d'unions

Rappel d'UE5 : l'ATM est une articulation **synoviale**, elle possède donc une **cavité** et une **capsule articulaire** qui va encapsuler toute l'articulation.

Cette capsule articulaire est tendue entre le <u>tubercule zygomatique antérieur</u>, le <u>tubercule zygomatique postérieur</u> (les 2 entourant la cavité glénoïde sur l'os temporal) et le <u>col</u> de la mandibule. Elle constitue le premier moyen d'union et de renforcement de l'ATM.

• En plus de la capsule articulaire, on retrouve des ligaments. Certains vont être des **épaississements** de la capsule : **les ligaments de renforcement** ; et d'autres seront **des ligaments à distance**. On retrouve 2 ligaments pour chaque catégorie :



- 1 : Liga collatéral médial *(donc capsule articulaire)*
- 2 : Liga collatéral latéral (<u>non visible en vue</u> <u>médiale</u>)
- 3 : Ligament stylo-mandibulaire
- 4 : Ligament sphéno-mandibulaire
- 5 : Processus styloïde du temporal
- 6 : Processus ptérygoïdiens du sphénoïde
- 7 : Angle de la mandibule (110°)

<u>Vue médiale</u> des moyens d'union de l'ATM (schéma du prof)

→ 2 Ligaments de renforcement permettent, entre autres, le maintien de l'ATM.

Ligament collatéral latéral = Corde de Farabeuf	 Très épais et +++ résistant Oblique en bas et en arrière Épaississement latéral de la capsule articulaire Tendu entre le tubercule zygomatique antérieur et le <u>col</u> de la mandibule Distance inextensible ==> <u>pivot</u> et <u>antépulsion</u> de la tête lors du mouvement d'ouverture
Ligament collatéral médial - Moins résistant que le latéral - Orientation identique que le LCL (en bas et en arrière)	

Tut' Help :

Cette partie sur l'ATM est, justement, assez mal compris chaque année car les explications sont assez floues... Il faut comprendre que, grâce à ce LCL qui représente une distance <u>inextensible</u> et qui maintient le col de la mandibule, lors de l'ouverture de la bouche on va avoir un mouvement de pivot de l'articulation vers l'avant, donc du disque articulaire, donc de la tête de la mandibule qui va s'antépulser.

Si vous avez encore des interrogations sur ce passage n'hésitez surtout pas à venir poster sur le fofo vous êtes les bienvenus ;)

- L'articulation temporo-mandibulaire, en plus d'être renforcée par les ligaments de renforcement *que l'on vient de voir*, est maintenue par <u>2 ligaments à distance</u> moins important dont les insertions sont dictées par leur nom :
- Ligament stylo-mandibulaire : insertion de la styloïde du temporal à l'angle de la mandibule
- Ligament sphéno-mandibulaire : insertion du sphénoïde à la lingula de la mandibule

IV. Muscles masticateurs

Cette articulation est animée par de nombreux muscles masticateurs permettant les différents mouvements qu'on a vu juste au-dessus. On retrouve des muscles spécifiques à l'occlusion et d'autres spécifiques à l'ouverture.


Tous vont être innervés par le nerf alvéolaire inférieur, issu du V₃... sauf le génio-hyoïdien +++++

Le prof ne détaille pas les muscles liés aux mouvements de latéralisation ni ceux de la propulsion on va donc voir ceux de l'occlusion et de l'ouverture uniquement. Je vous conseille de garder un oeil sur la page 5 pendant que vous faites cette partie pour bien comprendre quel muscle entraine l'antépulsion / la rétropulsion lors du mouvement d'ouverture / de fermeture.

A. Muscles de l'occlusion

On retrouve 4 muscles <u>puissants</u> permettant l'occlusion (= la fermeture) de l'ATM :

Tous ces muscles vont être innervé par le nerf alvéolaire inférieur (NAI) +++++++




3 : Muscle ptérygoïdien médial (par transparence car visible en vue médiale uniquement)

4 : Muscle ptérygoïdien latéral

1: Muscle Temporal


2 : Muscle Masséter



Temporal	 ⇒ Occlusif en antérieur principalement ⇒ Rétropulseur en postérieur Insertion sur la fosse temporale jusqu'au processus coronoïde de la mandibule Dirigé vers le bas et vers l'avant
Masséter	 → Occlusif Tendu entre le processus zygomatique et le tubercule masséterique au niveau de l'angle de la mandibule Dirigé vers le bas et l'arrière parallèlement au ptérygoïdien médial
Ptérygoïdien latéral = externe	 ⇒ Occlusif et Antépulseur
Ptérygoïdien médial = interne	 → Occlusif essentiellement Insertion dans la concavité des 2 ailes du processus ptérygoïdien et au niveau de l'angle de la mandibule Fibres obliques en bas et en arrière (comparable au muscle masséter)

B. Muscles de l'ouverture

Les muscles responsables du mouvement d'ouverture sont au nombre de 3 et s'insèrent tous sur l'os hyoïde. Moins puissants que les muscles occlusifs, ils font parties des muscles nommés sus-hyoïdiens étant donné qu'ils se trouve en position supérieur par rapport à l'os hyoïde.



1 : Muscle génio-hyoïdien gauche

2 : Muscle mylo-hyoïdien droit

3 : Muscle digastrique gauche

Vue inférieure des muscles sus-hyoïdiens de l'ouverture

Génio-hyoïdien (Génio- = menton)	 ⇒ Rétropulseur Tendu entre le corps de l'os hyoïde et la partie postérieur du menton Innervé par un rameau du XII (Hypoglosse) ++++ Recouvert par le mylo-hyoïdien tout dépend de la vue => pas de piège (SDR)
Mylo-hyoïdien (Mylo- = mandibule)	 Plus puissant et plus volumineux que le génio-hyoïdien Tendu entre le corps de l'os hyoïde et la partie médiale du corps de la mandibule (ligne mylo-hyoïdienne) Innervé par le nerf alvéolaire inférieur issu du V₃ #répétitiooon
Ventre antérieur du digastrique	 ⇒ Rétropulseur Trajet oblique vers le haut et l'avant

→ Précision sur le muscle digastrique :

Muscle composé de **2 ventres** séparés par un tendon intermédiaire passant dans une coulisse fibreuse sur la <u>petite</u> corne de l'os hyoïde.

Innervation particulière propre à ce muscle :

- Ventre <u>antérieur</u> (abaisseur de la mandibule) => **Nerf alvéolaire inférieur**
- Ventre <u>postérieur</u> => **Nerf facial VII**.

