

# DM : Parois osseuses du Petit Bassin

Tutorat 2020-2021 : 9 QCMS

**QCM 1 : A propos de la ceinture pelvienne, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) Elle est formée des deux os coxaux latéraux et du sacrum
- B) La ligne arquée est sur la face exopelvienne des os coxaux
- C) En position assise, le poids du corps repose sur les tubérosités ischiatiques
- D) L'articulation de la symphyse pubienne est de type synoviale plane
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 2 : A propos de l'os coxal, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) L'acétabulum, en forme de demi-sphère regardant en bas et en avant, est totalement encroûtée de cartilage
- B) Il a la forme d'un double cylindre sagittal
- C) L'aile iliaque, mince, regarde en arrière, en bas, et en dehors
- D) La fosse acétabulaire, partie non encroûtée du cotyle, s'articule avec la tête fémorale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 3 : A propos du sacrum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) Il existe 10 trous sacrés pelviens
- B) Il présente une double concavité sagittale et frontale
- C) Les rameaux antérieurs des nerfs sacrés passent par les trous sacrés de la face postérieure
- D) Le rameau antérieur du 5ème nerf spinal sacré passe par le 5ème trou pelvien antérieur
- E) La crête sacrée latérale est due à la fusion des processus transverses des vertèbres sacrées

**QCM 4 : A propos du détroit supérieur, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) Chez la femme, il a la forme d'un cercle régulier
- B) Il est formé entre autres par la réunion du promontoire, de la partie supérieure de la symphyse pubienne et par la ligne innominée
- C) Dirigé vers le bas et l'avant, il constitue la limite supérieure du pelvis minor
- D) Il s'inscrit dans un plan horizontal incliné vers l'avant d'environ 60°
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 5 : A propos de l'os coxal, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) La crête iliaque possède une concavité externe antérieure et une concavité interne postérieure
- B) La crête iliaque se démarque de l'aile par son épaisseur, notamment au niveau du tubercule du moyen fessier, partie la plus large de cette crête
- C) Le sourcil de l'acétabulum encadre la surface semi-lunaire de la cavité cotyloïde
- D) La tubérosité ischiatique se situe au dessus de la grande échancrure sciatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 6 : A propos des articulations de la ceinture pelvienne, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) La symphyse pubienne possède une capsule articulaire ainsi que des surfaces encroûtées de cartilage
- B) L'articulation sacro-iliaque est de type fibreuse et fonctionne suivant le mécanisme bouton-pression
- C) La symphyse pubienne, dont les surfaces articulaires sont écartées d'environ 1 cm, sont renforcées par des ligaments à distance
- D) Les ligaments de renforcement capsulaire inter-osseux et ilio-sacré postérieur sont très épais et résistants
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 7 : A propos du foramen obturé, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) Il se situe en regard de la surface quadrilatère de l'os coxal
- B) Il est encadré en bas par la branche ischio-pubienne de l'os coxal
- C) La corne antérieure de la surface semi-lunaire, très saillante, pointe au niveau de sa partie antéro-supérieure
- D) La gouttière du nerf obturateur, située sur son bord inférieur, brise sa partie antérieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 8 : A propos de la ceinture pelvienne, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) L'ogive pubienne est de l'ordre de 90° voire plus chez certaines femmes favorables à l'accouchement
- B) Le diamètre oblique du détroit supérieur mesure environ 12 cm
- C) Le coccyx peut subir un phénomène de rétropulsion augmentant le diamètre sous-pubien-coccygien à 12,5 cm
- D) Le sacrum de la femme parturiente subit un mouvement de nutation causant un redressement du promontoire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 9 : Sur le bord antérieur de l'os coxal, on trouve :**

**Indiquez la ou les bonne(s) réponse(s).**

- A) L'éminence ilio-pectinée correspond à une saillie osseuse située en regard du cotyle
- B) La vallée du psoas, correspondant à la gouttière du muscle psoas, est plus haut située que l'échancrure inter-épineuse
- C) L'épine iliaque-antéro-supérieure se projette en regard de l'aplomb du pubis
- D) L'épine ischiatique, au-dessus de la petite échancrure ischiatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses